

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα 7ου εξαμήνου ΣΗΜΜΥ

<http://www.corelab.ece.ntua.gr/courses/algorithms/>

<http://moodle.softlab.ntua.gr>

Ε. Ζάχος, Α. Παγουρτζής (Τομέας Computer Science ΣΗΜΜΥ)


## 1η Σειρά Ασκήσεων

### Άσκηση 1: Πρόβλημα Βασιλισσών. Λατινικά και Μαγικά Τετράγωνα.

- a. Σε μια σκακιέρα  $4 \times 4$  τοποθετήστε 4 βασίλισσες που να μην αλληλοαπειλούνται (Μέθοδος Οπισθοδρόμησης). Πόσες ουσιαστικά διαφορετικές λύσεις υπάρχουν;
- b. Το ίδιο για σκακιέρα  $5 \times 5$  με 5 βασίλισσες.
- c. Η επιφάνεια που δημιουργείται, αν ταυτίσουμε αφενός την πάνω με την κάτω πλευρά αφετέρου την δεξιά με την αριστερή πλευρά της σκακιέρας λέγεται τόρος. Δεν υπάρχει τρόπος να τοποθετηθούν 4 βασίλισσες στην τορο-σκακιέρα  $4 \times 4$  που να μην αλληλοαπειλούνται. Υπάρχει (ουσιαστικά μόνο ένας) τρόπος να τοποθετηθούν 5 βασίλισσες στην τορο-σκακιέρα  $5 \times 5$  ώστε να μην αλληλοαπειλούνται.
- d. Σε ένα πίνακα  $5 \times 5$  τοποθετήστε τα γράμματα  $a, b, c, d, e$  (ένα σε κάθε τετραγωνάκι) έτσι ώστε σε κάθε γραμμή, στήλη και διαγώνιο (και τοροειδώς) να έχουμε διαφορετικά γράμματα.
- e. Τοποθετήστε τώρα στον πίνακα  $5 \times 5$  συνδυασμούς των λατινικών γραμμάτων  $a, b, c, d, e$  και των ελληνικών γραμμάτων  $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon$  έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι συνθήκες του προηγούμενου ερωτήματος για τα λατινικά και τα ελληνικά, και επιπλέον να μην έχουμε τον ίδιο συνδυασμό δύο φορές (αυτό λέγεται λατινικό τετράγωνο).
- f. Αν θέσουμε  $a = \alpha = 0, b = \beta = 1, \gamma = \gamma = 2, d = \delta = 3, e = \epsilon = 4$  και διαβάσουμε το συνδυασμό ψηφίων στο πενταδικό σύστημα (π.χ.  $bd = 13_5 = 8$ ), τότε έχουμε ένα μαγικό τόρο (τοροειδές τετράγωνο). Δηλαδή, εμφανίζονται όλοι οι αριθμοί από 0 έως 24 έτσι ώστε τα αθροίσματα σε στήλες, γραμμές και (τοροειδείς) διαγωνίους να είναι ίσα. Ελέξτε το.
- g. Δοκιμάστε να βρείτε αλγοριθμικό κανόνα για την κατασκευή μαγικού τόρου  $5 \times 5$ . Σημειώτεον ότι δεν υπάρχει μαγικό τετράγωνο  $2 \times 2$ , υπάρχει  $3 \times 3, 4 \times 4, 6 \times 6, 8 \times 8, 9 \times 9$  αλλά δεν υπάρχει μαγικός τόρος. Υπάρχει όμως μαγικός τόρος  $5 \times 5, 7 \times 7, 11 \times 11$  (και πολλοί  $13 \times 13$ ). Τι σχέση υπάρχει μεταξύ των τριών προβλημάτων (όλα σε τόρο): Βασιλισσών-Λατινικών τετραγώνων-Μαγικών τετραγώνων;

## Άσκηση 2: Γραμμοσκιασμένα Τρίγωνα

Να τοποθετηθούν οι αριθμοί  $0, 1, \dots, 9$  στα κυκλάκια, ούτως ώστε τα γραμμοσκιασμένα τρίγωνα να έχουν το ίδιο άθροισμα.



## Άσκηση 3: Επαγωγή

Υπολογίστε τον κλειστό τύπο του παρακάτω αθροίσματος:  $\sum_{k=1}^N k2^{k-1}$ . Αποδείξτε με επαγωγή την ορθότητα του τύπου σας.

## Άσκηση 4

Να αποδείξετε την ισοδυναμία των παρακάτω προτάσεων:

- Ο γράφος είναι δένδρο.
- Ο γράφος είναι συνεκτικός με  $n - 1$  ακμές.
- Ο γράφος έχει  $n - 1$  ακμές και δεν έχει κύκλους.
- Αφαιρώντας μια οποιαδήποτε ακμή, ο γράφος από συνεκτικός γίνεται μη συνεκτικός.
- Κάθε ζεύγος κορυφών συνδέεται με ακριβώς ένα απλό μονοπάτι.
- Ο γράφος δεν έχει κύκλους αλλά η πρόσθεση οποιασδήποτε νέας ακμής δημιουργεί κύκλο.

## Άσκηση 5

Δείξτε ότι ένας γράφος περιέχει κλίκα μεγέθους  $k$  αν και μόνο αν ο συμπληρωματικός του έχει independent set μεγέθους επίσης  $k$ .

## Άσκηση 6

Ολική καταβόθρα σε ένα κατευθυνόμενο γράφο λέγεται μια κορυφή που δεν έχει επόμενες κορυφές και υπάρχει ακμή από κάθε άλλη κορυφή προς αυτή. Για κάθε μια από τις ανα- παραστάσεις του γράφου (πίνακα γειτνίασης και λίστα γειτνίασης) επινοήστε αποδοτικό αλγόριθμο που βρίσκει μια ολική καταβόθρα ή αποφαινεται ότι δεν υπάρχει. Ποια είναι η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου σας;

Να παραδοθούν μέχρι την 29-11-2007